

BULEȚIN DE AVERTIZARE
Nr. 4 din 09.03.2026

ATENȚIONARE FITOSANITARĂ!!!


Odată cu venirea primăverii și creșterea temperaturilor, culturile de rapiță se confruntă cu atacul de organisme dăunătoare, precum, *Ceutorhynchus* spp., *Phylotetra* spp, *Phoma* lingam. Întârzierea semănatului, răsărirea greoaie a plantelor din cauza lipsei precipitațiilor de la începutul toamnei, au condus la o dezvoltare slabă a plantelor, fiind foarte vulnerabile la atacul organismelor dăunătoare.

Oficiul Fitosanitar Giurgiu recomandă monitorizarea zilnică a culturii, verificarea capcanelor și intervenția fără întârziere cu tratamentele fitosanitare.

Ceuthorhynchus napi (gărgărița tulpinilor de rapiță), ***Ceuthorhynchus pallidactylis*** (gărgărița tulpinilor de varză).

Sunt dăunători agresivi, greu de combătut odată ce larvele încep să se dezvolte. Eliminarea plantelor din aceeași familia (cea a cruciferelor), poate ajuta la controlul răspândirii dăunătorului.

Adulții de **gărgărița tulpinilor de rapiță** au corpul de culoare cenușiu spre negru, cu aspect pufos, și lungime de 3,5-4 mm. Rostrul poate ajunge până la 1/3 din lungimea corpului. Larvele au 5-8 mm lungime, de culoare gălbuie, cu protuberanțe înserate cu perișori, cu excepția capului care, prezintă o colorație de la galben spre negru.



Gărgărița tulpinilor de rapiță, hibernează în sol ca adult și începe migrarea în condiții neașteptate, când temperatura solului la 2 cm adâncime ajunge la 6°C. Perioada de activitate a **gărgăriței tulpinilor de rapiță** începe în ferestrele iernii, atunci când temperaturile au valori mai mari de 6°C cu zile însorite atunci când plantele pornesc în vegetație și continuând până la sfârșitul înmuguritului, iar perioada de atac a dăunătorului începe la temperaturi de 9-12°C.

Modul de dăunare: Adulții fac perforații marginale pe vârful tulpinilor și pe frunze unde depun pontă. Larvele rod galerii în măduva tulpinilor.

Consecințele atacului: Încetinirea creșterii plantei și creșterea numărului porților de intrare pentru diferite boli ale tulpinii sunt doar unele dintre efectele atacului **gărgăriței tulpinilor**. Mai mult decât atât, plantele devin vulnerabile la cădere sau ramifică bogat. Și, nu în ultimul rând, nu formează silicve sau acestea sunt seci și cu semințe de slabă calitate.

Combaterea pe cale chimică a **gărgărițelor tulpinilor** la hibernare se face atunci când se constată apariția lor în capcanele galbene. Tratatamentul trebuie aplicat imediat ce au apărut primii adulți, înainte de depunerea pontei. Larvele din interiorul tulpinilor sunt foarte dificil sau chiar imposibil de combătut. După depunerea ouălor, practic, nu mai există metodă de combatere.

Pentru a preveni atacul **gărgăriței tulpinilor de rapiță**, se recomandă rotirea culturii de rapiță astfel încât să revină pe același teren o dată la aproximativ 3 ani.



AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA
OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV-CĂLĂRAȘI-GIURGIU
OFICIUL FITOSANITAR GIURGIU
Str.Ghizdarului Nr. 2, Giurgiu, Tel+40787602650,
email ofgiurgiu@anf.ro, cod poștal 080583,

Perioada optimă de tratament contra gărgăriței tulpinilor de rapiță se face la **depistarea atacului** - (P.E.D.: 1-2 adulți pe plantă), urmat de un al doilea la o săptămână, pentru o mai bună eficiență, cu unul dintre produsele:

KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comercială) - 0,15 l/ha
DELTA GRI / (FASTER DELTA - a doua denumire comercială) - 0,3 l/ha
SUMI ALPHA 5 EC / WIZARD - 0,250 l/ha
MOSPILAN 20 EC (KRIMA 20 SG) - 0.20 kg/ha
DECIS EXPERT 100EC - 75 ml/ha

Pentru combaterea Phoma lingam (putregaiul negru al rapiței), boală prezentă încă din toamnă, se poate adăuga în soluție, un fungicid specific combaterii acesteia, acolo unde este cazul:

1. **ORIUS 25 EW/SALVATOR 25 EV - 0,5 l/ha sau**
3. **FOLICUR SOLO 250 EW / VALOR 250 EW - 0,5 l/ha sau**

sau alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Perioada de maxima sensibilitate pentru cultura este înainte ca ea să ajungă la 20 cm. înălțime.

Pentru aderarea soluției pe plantă, în soluția de stropit se adaugă un adjuvant.

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine în conformitate cu Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicărilor cu produse pentru protecția plantelor).

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării rurale, nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/542015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Aveți obligația de a deține Registrul de Evidență a Tratatamentelor cu produse de protecție a plantelor (care trebuie completat la zi), conform modelului anexat și să țină evidența contabilă a produselor utilizate pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Avizat,
Coordonator OF Giurgiu

Tăranu Mihaela

Elaborat,
Cojocaru Mariana