










AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV-CĂLĂRAȘI-GIURGIU
OFICIUL FITOSANITAR GIURGIU
Str. Ghizdarului Nr. 2, Giurgiu, Tel+40787602650,
email ofgiurgiu@anf.ro, cod poștal 080583,

ALERTĂ FITOSANITARĂ!!!!

LYCORMA DELICATULA (Musca felinar pătată) detectat pentru prima dată în REPUBLICA MOLDOVA





La 14 august 2026, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din Republica Moldova a confirmat oficial **prima detectare pe teritoriul țării** a dăunătorului de carantină *Lycorma delicatula*. Focarul, izolat, a fost identificat în municipiul Chișinău, într-o zonă industrială, pe vegetație spontană — în special pe *Ailanthus altissima* (cenușar). Au fost depistați atât adulți, cât și nimfe, pe mai mulți arbori. În jurul zonei a fost stabilită o arie delimitată și o zonă-tampon de 1 km, cu măsuri de eradicare și monitorizare continuă. Pentru România, aflată în imediata vecinătate, acest lucru înseamnă un **risc real de introducere și răspândire** — motiv pentru care vigilența și depistarea precoce devin esențiale. *Lycorma delicatula* este **organism de carantină pentru Uniunea Europeană**, inclus în Anexa II, Partea A a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072 (organisme de carantină a căror prezență nu este cunoscută pe teritoriul Uniunii). Specia figurează și pe **lista EPPO A1**. Până în prezent, ea **nu este prezentă în România și nici în Uniunea Europeană**; detectarea din Republica Moldova este prima din imediata vecinătate. *Un focar izolat, la granița României, aduce în atenție un risc real de introducere. Cea mai importantă măsură rămâne depistarea precoce și notificarea imediată a autorității fitosanitare.*

Ce este *Lycorma delicatula*?

Lycorma delicatula, cunoscută în engleză drept „spotted lanternfly”, este o insectă din ordinul Hemiptera (familia *Fulgoridae*), originară din Asia de Est. Este un dăunător puternic **polifag**: atacă **peste 100 de specii** de plante din sectoarele horticole, viticole și forestiere.

Gazda sa preferată este *Ailanthus altissima* (cenușarul), dar printre plantele gazdă importante economic se numără *Vitis vinifera* (vița-de-vie), *Juglans* (nuc), *Acer* (arțar), *Prunus* (cireș, piersic, prun), *Malus* (măr) și *Salix* (salcie).

De ce este periculos

Nimfele și adulții înțepă țesutul conducător (floemul) și **extrag seva**, provocând răni cu scurgeri de sevă, ofilirea lăstarilor, necrozarea ramurilor și slăbirea generală a plantei.

În plus, insecta elimină cantități mari de **rouă de miere** (excreții zaharoase), pe care se dezvoltă **fumagina** — un strat negru ce acoperă frunzele și fructele, blochează fotosinteza și duce la defoliere timpurie. În plantațiile viticole și pomicole, efectul este direct economic: recolte reduse, acumulare scăzută de zaharuri, deprecierea calității fructelor și chiar pieirea butucilor de viță-de-vie.

Cum se răspândește: mai ales prin activitatea umană



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV-CĂLĂRAȘI-GIURGIU
OFICIUL FITOSANITAR GIURGIU

Str. Ghizdarului Nr. 2, Giurgiu, Tel+40787602650,
email ofgiurgiu@anfof.ro, cod poștal 080583,

Pe distanțe lungi, *Lycorma delicatula* se răspândește în principal prin **transportul ouălor**. Femela depune pontă nu doar pe plante, ci și pe suprafețe inerte: ambalaje și paleți din lemn, bușteni, piatră de carieră, containere, utilaje și vehicule. Astfel, masele de ouă camuflate pot călători internațional, neobservate.

Măsuri de prevenire și vigilență:

- **Inspecție vizuală:** verificați materialul săditor lemnos, buștenii și mijloacele de transport provenite din zone afectate, căutând mase de ouă cu aspect de noroi uscat.
- **Depistare precoce:** amplasarea de capcane lipicioase sau de tip „cîrele trunk” pe arborii gazdă, în special pe cenușar (*Ailanthus altissima*).
- **Nu deplasați materialul suspect:** evitați transportul lemnului, paleților sau al altor obiecte pe care observați mase de ouă.
- **Notificare imediată:** raportați orice suspiciune la oficiul fitosanitar județean sau la Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF).

Depistarea precoce a unui organism de carantină face diferența între un focar izolat, care poate fi eradicat, și o răspândire greu de controlat. **Un singur semnalment la timp poate opri instalarea dăunătorului.**

Cum îl recunoști, în funcție de stadiu Aspectul insectei se schimbă mult pe parcursul anului. Reperele de mai jos ajută la o identificare rapidă:

Stadiu	Perioadă	Cum arată
Ouă	Octombrie – Mai	Mase de 30–50 de ouă, acoperite cu o secreție cearoasă cenușiu-maronie, cu aspect de noroi uscat și crăpat, depuse pe scoarță sau pe obic
Nimfe, vârstele I–III	Mai – Iulie	Corp de 3,5–9 mm, negru, cu pete albe distincte pe corp și picioare; foarte agile și săritoare.
Nimfe, vârsta IV	Iulie – August	Corp de 11–15 mm, roșu aprins, cu pete albe și dungi negre.
Adulți	Iulie – Noiembrie	21–27 mm; aripi anterioare gri cu pete negre la bază; aripi posterioare roșii cu pete negre și o bandă albă transversală.