


ATENȚIONARE FITOSANITARĂ!!
UN NOU DĂUNĂTOR A INTRAT PE RADARUL FITOSANITAR EUROPEAN!!!



OEPP a inclus pe Lista sa de alertă specia *Erthesina fullo* (Ploșnița cu pete galbene), originară din Asia. Este deja stabilită în Albania, iar exemplare izolate au fost găsite în Belgia, Grecia și Italia. În România nu a fost semnalată.

Erthesina fullo este o ploșniță din ordinul Hemiptera, familia Pentatomidae — aceeași familie din care face parte și ploșnița brună marmorată (*Halvomorpha halys*), prezentă deja în România.

Adulții sunt ploșnițe mari, de 18–23 mm, brun-închis spre negru, acoperite cu numeroase pete galbene sau portocalii. Ouăle sunt depuse în ponte grupate, de regulă pe fața inferioară a frunzelor. Specia are cinci vârste nimfale, iar în zonele temperate ale arealului dezvoltă de obicei o singură generație pe an (univoltină) și iernează ca adult.

Specia este extrem de polifagă: se hrănește cu peste 60 de specii de plante gazdă, aparținând a peste 30 de familii botanice. Dintre gazdele importante economice: kiwi (*Actinidia* spp.), păr (*Pyrus* spp.), măr (*Malus domestica*), piersic (*Prunus persica*), cais (*Prunus armeniaca*), rodie (*Punica granatum*), curmal chinezesc sau jujuba (*Ziziphus jujuba*), citrice (*Citrus* spp.) și macadamia (*Macadamia* spp.).

Este semnalată și pe plante forestiere, ornamentale și spontane, printre care tei (*Tilia cordata*), salcâm (*Robinia pseudoacacia*), plop (*Populus* spp.) și ulm (*Ulmus* spp.).

Ce daune produce

Nimfele și adulții înțepă și sug frunzele, florile, lăstarii și fructele. În urma atacului apar decolorări, ofiliri sau defolieri, țesuturi uscate ori suberificate, deformarea fructelor și scăderea calității acestora. Rănile produse prin hrănire pot deveni poartă de intrare pentru bacterii și ciuperci patogene, ducând la putrezirea fructelor. În cazurile grave, fructele cad prematur, înregistrându-se pierderi importante de recoltă. În arealul nativ au fost raportate pierderi de 10–30% în plantațiile de kiwi, până la 60% la păr și de circa 20% la măr și la macadamia.

De ce contează pentru România

Gazdele principale — mărul, părul, piersicul, caisul — sunt culturi de bază ale pomiculturii românești, iar plantele gazdă sunt abundente atât în livezi, cât și în spațiul urban și în habitatele naturale.

Cum se răspândește

Pe distanțe scurte prin zborul adulților, iar pe distanțe lungi aproape exclusiv prin activitățile umane — se ascunde în containere, vehicule, utilaje și bagaje, iar ouăle și nimfele călătoresc pe plante gazdă.

Ce poți face: verifică marfa și mijloacele de transport venite din zonele afectate, nu muta materialul suspect, fotografiază insecta și anunță Oficiul Fitosanitar Giurgiu sau ANF.

Pentru un organism aflat pe lista de atenționare, depistarea precoce este singurul avantaj real: cu cât o primă apariție este semnalată mai devreme, cu atât sunt mai mari șansele ca ea să rămână un incident izolat.